北海道の花粉

2024.03.05

合同会社クロスタート

2024年
シラカバ花粉予測

例年比：230％【2.3倍】
昨年比：600％【6.0倍】

2024年01月18日時点での情報に基づいています　引用：日本気象協会

2024年 各地域の花粉飛散傾向

地方	例年比		前シーズン比		2023年 夏の気象(6～8月) 気温	降水量	日照時間
北海道	非常に多い	230%	非常に多い	630%	かなり高い	平年並	多い
東北	やや多い	140%	多い	150%	かなり高い	少ない	かなり多い
関東甲信	並	100%	少ない	50%	かなり高い	平年並	かなり多い
北陸	やや多い	140%	少ない	60%	かなり高い	平年並	かなり多い
東海	やや多い	120%	並	90%	かなり高い	多い	かなり多い
近畿	やや多い	130%	やや少ない	70%	かなり高い	多い	多い
中国	やや多い	120%	少ない	60%	かなり高い	平年並	平年並
四国	並	100%	少ない	60%	高い	多い	平年並
九州	やや多い	120%	やや少ない	70%	かなり高い	平年並	平年並

花粉飛散量の予測根拠

花粉の飛散量は、前年夏の気象条件が大きく影響します。2023 年は、夏の猛暑の影響で、花芽の形成に好条件な「高温・多照・少雨」という気象条件が九州から北海道にかけて揃いました。
また、花粉の飛散量は、前年 春の飛散量も影響し、多く飛散した翌年は減少する傾向があるといわれています。
2023 年は、春の花粉飛散量 が多い傾向となったため、秋に観察されたスギ雄花の花芽の量は、ほとんどの地域で 2022 年の秋より少ないこ とが報告されています。 このことから、2024 年春の花粉の飛散量は北海道では、前 シーズンの飛散量が少なかったため、前シーズンより非常に多い見込みです。

北見市内の花粉の飛び始め
2023年
4月22日頃から
例　年
5月04日頃から